

Győr-Moson-Sopron vármegyei növényegészségügyi helyzetképe

2025.május 15.

Időjárás:

Áprilisi időjárás szeszélyes volt. A lehűlések és a felmelegedések váltakoztak, így kedvező feltételeket teremtettek a különböző kártevőknek, károsítóknak. Április hónapban 16 mm, míg május első két hetében 17,9 mm csapadék hullott Osztályunk udvarán mért adatok szerint. Ez a csapadék mennyiség kevésbé pótolta a kiszáradt talaj vízkészletét, de a gyomok szaporodásának, növekedésének kedvezett.

Fenológiai állapot:

Őszi búza: virágzás kezdete

Őszi káposztarepce: becőérés

Kukorica: kelés. 2-4 leveles

Napraforgó: kelés, 4-6 leveles

Károsítóhelyzet:

Polifág károsítók(mezei pocok)

Győr-Moson-Sopron megyében a mezei pocokfertőzöttség gyenge.

Gabonafélék:


Az őszi kalászosok fejlődése eléggé vontatott volt a hideg időjárásban, majd a csapadék hatására megugrottak. A gyomoknak is kedvezett a csapadékos időjárás. A károsítók közül a vetésfehérítők is szép számban fordulnak elő. A gombabetegségeknek is kedvezett a hűvös, csapadékos, majd meleg idő. A levélbetegségek közül a lisztharmat és a vörösrózsa jelentkezett az állományokban.



Kukorica:

Sorolnak a kukoricák, a vetésidőtől függően heterogén képet mutatnak, keléstől a 3-4 levelesig minden előfordul. A fagyosszentek hideg reggeleket hoztak, fázik a kukorica, ezt jelzi az alsó levelek elszíneződése.





Szépen fejlődnek a napraforgók is, de már kel a parlagfű is.



A változékony időjárás, a lehűlések kedveztek a tafrina fertőzésnek az őszibarackfákon. Aki elhagyta a télvégi lemosó permetezést, nehezen tudja megfogni a károsítót. A csonthéjasokban, elsősorban szilván, cseresznyén, kajszibarackon és mandulán erősödtek a levéllikasztó betegség tünetei. Almában erős a levélpirosító alma-levéltetű fertőzése, szívogatásától torzulnak a levelek.

A csapadékos idő előcsalogatta a házas- és meztelencsigákat, Több készítmény más forgalmi kategóriába került, így nehéz ellenük a vegyszeres védekezés, érdemes kipróbálni házi praktikákat (pl. sörccsapda).

A kertekben megkezdte károsítását a selyemfényű puszpángmoly. A kártevő háromnemzedékes, a fiatal lárvák ellen elkezdhetünk védekezni.

Díszfáinkon, elsősorban a tujákon a „komfortérzet” hiánya mutatkozik. Megfelelő mennyiségű öntözéssel és a tápanyagok pótlásával a hazai körülményeket is jobban elviselik.

Megjelentek a levéltetvek a dísznövényeken is, főleg a rózsák erősen fertőzöttek. Ha a piretroidokat alkalmazzuk, azok gyors hatásúak, amit eltalál a permetszer, azt elpusztítja, letaglózza. Rövidebb-hosszabb ideig tartó tartamhatásuk pedig abban nyilvánul meg, hogy némelyikük elriasztja az ismételt berepülésre készülő rovarokat.

A növények megsínylik az időjárás viszontagságait. Az áprilisi fagyok hatását elsősorban a gyümölcsösök és a szőlő szenvedték. A sokkhatást szenvedett növények kezelésére javasoljuk az algakivonatot, növényi illóolajokat tartalmazó készítménnyel való permetezést, 2-3 használat után látványos javulást láthatunk a növényeken. Ezzel a készítménnyel való permetezéssel a növény gyökér szőrözöttsége megnövekedik, több makro- és mikrotápanyagot képes felvenni a talajból, ellenálló képessége javul, könnyebben kiheveri a jég-, vagy porverés, szélviharok, gyomirtók okozta stresszt is.

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal

Agrárügyi Főosztály

Növény- és Talajvédelmi Osztály