

2024. év

Az oldalon szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek!\*



Név	Engedélyokirat száma	Engedély típusa	Kultúra	Hatóanyag	Dózis:	Permetlé l/ha	Dózis kiskerti használatra	Amerikai szőlőkabócára előírt növényvédelmi technológia	Méhveszélyesség:
<b>DECIS</b> <i>III. kategória</i>	04.2/557-1/2011. MgSzH; 6300/2986-1/2021.	alapengedély	csemege- és borszőlő	Deltametrin	0,15 l/ha <b>Max. 2 alkalommal, két kezelés közt eltelt idő min.14 nap</b>	500-800	1,5 ml/10 l víz	Kizárólag kiskerti felhasználásra, 1000 m <sup>2</sup> -nél nem nagyobb terület kezelésére, évente legfeljebb kétszer alkalmazható. Amerikai szőlőkabóca ellen az L1-L3 fejlettségű lárvák megjelenésekor célszerű elvégezni a permetezést.	Rendeltetésszerű felhasználása esetén mérsékelten kockázatos
<b>DECIS FORTE</b> <i>I. kategória</i>	04.2/8155-1/2015. NÉBIH; 6300/783-3/2022.	alapengedély	szőlő (bor, csemege)	Deltametrin	0,075 l/ha <b>Max. 2 alkalommal, két kezelés közt eltelt idő min.14 nap</b>	500-1000	-	Az amerikai szőlőkabóca ellen az L3-L4 fokozatú lárvák, valamint a később megjelenő imágók rajzása idején javasolt a védekezést végre hajtani.	Mérsékelten kockázatos
<b>DECIS MEGA</b> <i>II. kategória</i>	02.5/2000/4/2008. MgSzHK; 6300/2985-1/2021.	alapengedély	csemege- és borszőlő	Deltametrin	0,15 l/ha <b>Max. 3 alkalommal, két kezelés közt eltelt idő min.14 nap</b>	500-800	-	Amerikai szőlőkabóca ellen az L1-L3 fejlettségű lárvák megjelenésekor célszerű elvégezni a permetezést.	Rendeltetésszerű felhasználása esetén mérsékelten kockázatos
<b>DETECTOR</b> <i>I. kategória</i>	6300/2587-2/2022.	származtatott engedély „A Detector rovarölő permetezőszert azonos a 04.2/8155-1/2015. NÉBIH számon engedélyezett Decis Forte rovarölő permetezőszerral.”	szőlő (bor, csemege)	Deltametrin	0,075 l/ha <b>Max. 2 alkalommal, két kezelés közt eltelt idő min.14 nap</b>	500-1000	-	Az amerikai szőlőkabóca ellen az L3-L4 fokozatú lárvák, valamint a később megjelenő imágók rajzása idején javasolt a védekezést végre hajtani.	Mérsékelten kockázatos
<b>FULL 5 CS</b> <i>III. kategória</i>	04.2/640-1/2014.	származtatott engedély „A Full 5 CS azonos a Karate Zeon 5 CS, 11769/2002. FVM számon engedélyezett rovarölő permetezőszerral.”	szőlő	Lambda-cihalotrin	0,25 l/ha <b>Max. 2 alkalommal, két kezelés közt eltelt idő min.10 nap</b>	800-1000	2,5 ml/ 5 l víz	Amerikai szőlőkabóca ellen 0,25 l/ha dózissal célszerű permetezni az L1-L3 fejlettségű lárvák megjelenésekor. Az okiratban a kijuttatáshoz feltüntetett vízmennyiségek javasolt értékek. A kijuttatás során a permetlé mennyiségét a kezelendő növényállomány fejlettségétől, lombfelületétől és művelésmódjától, valamint az alkalmazott géptípustól függően kell megválasztani.	mérsékelten kockázatos

\*A táblázat a rovarölő permetezőszerek, 2024.06.10. napján hatályos engedélyokiratai alapján készült.

Az engedélyokiratokban történt módosításokat, a készítmény felhasználása előtt, annak engedélyokiratában szükséges ellenőrizni!

Oldal:

7/1

2024. év

Az oldalon szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek!\*



Név	Engedélyokirat száma	Engedély típusa	Kultúra	Hatóanyag	Dózis:	Permetlé l/ha	Dózis kiskerti használatra	Amerikai szőlőkabócára előírt növényvédelmi technológia	Méhveszélyesség:
<b>GAZELLE 20 SG</b> Forg.kat.: 200g - 5 kg - I. 5g -120g - II. 4 g-ig III.	04.2/270-1/2012. MgSZH 04.2/2679-1/2013.	származtatott engedély „A Gazelle 20 SG azonos a <b>Mospilan 20 SG</b> 04.2/2883-1/2011. MgSzH számon engedélyezett rovarölő permetezőszerszel.”	szőlő	Acetamiprid	0,25-0,375 kg/ha  <b>Max. 1 alkalommal használható</b>	400-800	2,5-3,75 g/10 l víz	Szőlőben az amerikai szőlőkabóca esetében előrejelzés alapján a fiatal lárvák (L1-L3) ellen kell időzíteni a védekezést. <b>A készítmény tebukonazol tartalmú növényvédő szerrel együtt tankkeverékként kijuttatva méhekre veszélyes, ebben az esetben méhkímélő technológia alkalmazása szükséges!</b>	nem jelölésköteles <b>(Tebukonazol tartalmú növényvédőszerrel keverve MÉHEKRE VESZÉLYES!)</b>
<b>HUNTER</b> II. kategória <i>Felhasználása 2025. október 30-ig engedélyezett.</i>	04.2/1008-1/2017; 6700/0046355-1/2024	származtatott engedély „A Hunter azonos a 02.5/966/2/2010. MgSzHK számon engedélyezett <b>Kaiso EG</b> rovarölő permetezőszerszel.”	szőlő (csemege-borszőlő)	Lambda-cihalotrin	0,25 kg/ha  <b>Max. 1 alkalommal használható</b>	600-1200	-	Amerikai szőlőkabócaellen 0,25 kg/ha dózissal célszerűpermetezni az L1-L3 fejlettségűlárvák megjelenésekor. A permetlé mennyiségét az ültetvények művelésmódjától, lombfelületének nagyságától és a géptípustól függően kell megválasztani.	mérsékeltlen veszélyes
<b>JAGER EG</b> II. kategória <i>Felhasználása 2025. október 30-ig engedélyezett.</i>	6300/720-2/2021.; 6700/0046358-1/2024	származtatott engedély „A Jager EG azonos a 02.5/966/2/2010. MgSzHK számon engedélyezett <b>Kaiso EG</b> rovarölő permetezőszerszel.”	szőlő (csemege-borszőlő)	Lambda-cihalotrin	0,25 kg/ha  <b>Max. 1 alkalommal használható</b>	600-1200	-	Amerikai szőlőkabócaellen 0,25 kg/ha dózissal célszerűpermetezni az L1-L3 fejlettségűlárvák megjelenésekor. A permetlé mennyiségét az ültetvények művelésmódjától, lombfelületének nagyságától és a géptípustól függően kell megválasztani.	mérsékeltlen veszélyes
<b>K1</b> III. kategória <i>Felhasználása 2025. október 30-ig engedélyezett.</i>	04.2/2366-1/2012. NÉBIH; 04.2/2750-1/2013.	származtatott engedély „A K1 azonos a <b>Kaiso Garden</b> , 04.2/2365-1/2012. NÉBIH számon engedélyezett rovarölő permetezőszerszel.”	szőlő (csemege-borszőlő)	Lambda-cihalotrin	-	-	2,5 g / 10 l víz	Amerikai szőlőkabóca ellen 2,5 gramm szer szükséges 10 liter vízhez. A permetezést az L1-L3 fejlettségűlárvák megjelenésekor célszerűelvégezni. A 10 l permetlével kezelhető terület nagysága 100 m <sup>2</sup> .	mérsékeltlen kockázatos
<b>KAISO EG</b> II. kategória <i>Felhasználása 2025. október 30-ig engedélyezett.</i>	02.5/966/2/2010. MgSzHK; 6700/2365-2/2023 6700/0044817-1/2024	alapengedély	szőlő (csemege-borszőlő)	Lambda-cihalotrin	0,25 kg/ha  <b>Max. 1 alkalommal használható</b>	600-1200	-	Amerikai szőlőkabócaellen 0,25 kg/ha dózissal célszerűpermetezni az L1-L3 fejlettségűlárvák megjelenésekor. A permetlé mennyiségét az ültetvények művelésmódjától, lombfelületének nagyságától és a géptípustól függően kell megválasztani.	mérsékeltlen veszélyes

\*A táblázat a rovarölő permetezőszerek, 2024.06.10. napján hatályos engedélyokiratai alapján készült.

Az engedélyokiratokban történt módosításokat, a készítmény felhasználása előtt, annak engedélyokiratában szükséges ellenőrizni!

Oldal:

7/2

2024. év

Az oldalon szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek!\*



Név	Engedélyokirat száma	Engedély típusa	Kultúra	Hatóanyag	Dózis:	Permetlé l/ha	Dózis kiskerti használatra	Amerikai szőlőkabócára előírt növényvédelmi technológia	Méhveszélyesség:
<b>KAISO GARDEN</b> <i>III. kategória</i> <i>Felhasználása 2025. október 30-ig engedélyezett.</i>	04.2/2365-1/2012. NÉBIH; 6700/2619-2/2023; 6700/0048529-1/2024	alapengedély	szőlő (csemeg-borszőlő)	Lambda-cihalotrin	-	-	2,5 g/ 10 l víz	Amerikai szőlőkabóca ellen 2,5 gramm szer szükséges 10 liter vízhez. A permetezést az L1-L3 fejlettségű lárvák megjelenésekor célszerű elvégezni. A 10 l permetlével kezelhető terület nagysága 100 m <sup>2</sup> .	mérsékelt kockázatos
<b>KAISO SORBIE</b> <i>II. kategória</i> <i>Felhasználása 2025. október 30-ig engedélyezett.</i>	6300/2309-2/2021 6700/0046583-1/2024	párhuzamos engedély <i>A növényvédő szer ezen engedélyben és a referencia termék (KAISO EG) 02.5/966/2/2010. MgSzHK számú engedélyokiratában foglaltak alapján hozható forgalomba és használható fel.</i>	szőlő (csemeg-borszőlő)	Lambda-cihalotrin	0,25 kg/ha <b>Max. 1 alkalommal használható</b>	600-1200	-	Amerikai szőlőkabóca ellen 0,25 kg/ha dózissal célszerű permetezni az L1-L3 fejlettségű lárvák megjelenésekor. A permetlé mennyiségét az ültetvények művelésmódjától, lombfelületének nagyságától és a géptípustól függően kell megválasztani.	mérsékelt veszélyes
<b>KARATE ZEON 5 CS</b> <i>III. kategória</i>	11769/2002. FVM; 6700/2118-3/2023.	alapengedély	szőlő	Lambda-cihalotrin	0,25 l/ha <b>Max. 2 alkalommal, két kezelés közt eltelt idő min.10 nap</b>	800-1000	2,5 ml/ 5 l víz	Amerikai szőlőkabóca ellen 0,25 l/ha dózissal célszerű permetezni az L1-L3 fejlettségű lárvák megjelenésekor. Az okiratban a kijuttatáshoz feltüntetett vízmennyiségek javasolt értékek. A kijuttatás során a permetlé mennyiségét a kezelendő növényállomány fejlettségétől, lombfelületétől és művelésmódjától, valamint az alkalmazott géptípustól függően kell megválasztani.	mérsékelt kockázatos
<b>KENDO 5 CS</b> <i>III. kategória</i>	6700/0005510-1/2024	származtatott engedély „A Kendo 5 CS rovarölő permetezőszert azonos a 11769/2002. FVM számon engedélyezett <b>Karate Zeon 5 CS</b> rovarölő permetezőszerszel.”	szőlő	Lambda-cihalotrin	0,25 l/ha <b>Max. 2 alkalommal, két kezelés közt eltelt idő min.10 nap</b>	800-1000	2,5 ml/ 5 l víz	Amerikai szőlőkabóca ellen 0,25 l/ha dózissal célszerű permetezni az L1-L3 fejlettségű lárvák megjelenésekor. Az okiratban a kijuttatáshoz feltüntetett vízmennyiségek javasolt értékek. A kijuttatás során a permetlé mennyiségét a kezelendő növényállomány fejlettségétől, lombfelületétől és művelésmódjától, valamint az alkalmazott géptípustól függően kell megválasztani.	mérsékelt kockázatos

\*A táblázat a rovarölő permetezőszerek, 2024.06.10. napján hatályos engedélyokiratai alapján készült.

Az engedélyokiratokban történt módosításokat, a készítmény felhasználása előtt, annak engedélyokiratában szükséges ellenőrizni!

Oldal:

7/3

2024. év

Az oldalon szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek!\*



Név	Engedélyokirat száma	Engedély típusa	Kultúra	Hatóanyag	Dózis:	Permetlé l/ha	Dózis kiskerti használatra	Amerikai szőlőkabóca elleni növényvédelmi technológia	Méhveszélyesség:
<b>KLARTAN 24 EW</b> 50 ml-esnél nagyobb kiszerelések II. forgalmi kategória, 50 ml-es és annál kisebb kiszerelések III. forgalmi kategória	02.5/2322/2/2007. MgSzhK; 6300/3324-2/2020.	alapengedély	szőlő	Tau-fluvalinát	0,2-0,3 l/ha <b>Max. 2 alkalommal, két kezelés közt eltelt idő min.14 nap</b>	600-1000	3 ml szer/10 l víz	Az amerikai szőlőkabóca valamennyi fejlődési stádiuma ellen felhasználható. Elsősorban az L1-L3 fejlettségű lárvák ellen kell a védekezést időzíteni. Egy tenyészidőszak alatt maximum 2 alkalommal juttatható ki a készítmény. A további permetezéseket más hatóanyagcsoportba tartozó készítménnyel kell elvégezni. Nagyobb fertőzési nyomás esetén és az amerikai szőlőkabóca imágója ellen a magasabb dózist kell alkalmazni.	nem jelölésköteles
<b>LAMDEX EXTRA III. kategória</b>	12412/2002 FVM; 6700/1264-3/2023	alapengedély	szőlő (bor-, csemege-)	Lambda-cihalotrin	0,3-0,5 kg/ha <b>Max. 2 alkalommal, két kezelés közt eltelt minimális időtartam 10 nap.</b>	600-1000	5-8 g / 10 l víz	-	mérsékelten veszélyes
<b>LASER II. kategória</b>	02.5 /1414/4/2008. MgSzhK; 6300/2920-1/2022.	alapengedély	szőlő	Spinozad	0,4 l/ha <b>Max. 2 alkalommal, két kezelés közt eltelt idő min.7 nap</b>	600-1000	-	Amerikai szőlőkabóca ellen 0,4 l/ha dózissal a fiatal lárvák ellen szükséges kipermetezni.	mérsékelten kockázatos
<b>LASER DUPLO</b> 40 ml-esnél nagyobb kiszerelések II. forgalmi kategória, 40 ml-es és annál kisebb kiszerelések: III.forgalmi kategória	46797/2004. FVM; 6700/838-1/2023.	alapengedély	szőlő	Spinozad	0,2 l/ha <b>Max. 2 alkalommal, két kezelés közt eltelt idő min.7 nap</b>	600-1000	0,02 % (A 0,02 %-os permetlé elkészítéséhez 2 ml szer és 10 l víz szükséges)	Amerikai szőlőkabóca ellen 0,2 l/ha dózissal a fiatal lárvák ellen szükséges kipermetezni, a kezelés szükség esetén megismételhető. Szőlőben amerikai szőlőkabóca ellen a készítmény évente legfeljebb 2 alkalommal használható fel.	mérsékelten kockázatos
<b>MAVRİK 24 EW</b> 50 ml-esnél nagyobb kiszerelések II. forgalmi kategória, 50 ml-es és annál kisebb kiszerelések III. forgalmi kategória	04.2/2796-1/2017. NÉBIH; 04.2/2158-2/2018.	származtatott engedély "A <i>Mavrik 24 EW</i> azonos a 02.5/2322/2/2007. MgSzhK számon engedélyezett <i>Klartan 24 EW</i> rovarölő permetezőszerszel."	szőlő	Tau-fluvalinát	0,2-0,3 l/ha <b>Max. 2 alkalommal, két kezelés közt eltelt idő min.14 nap</b>	600-1000	3 ml szer/10 l víz	Az amerikai szőlőkabóca valamennyi fejlődési stádiuma ellen felhasználható. Elsősorban az L1-L3 fejlettségű lárvák ellen kell a védekezést időzíteni. Egy tenyészidőszak alatt maximum 2 alkalommal juttatható ki a készítmény. A további permetezéseket más hatóanyagcsoportba tartozó készítménnyel kell elvégezni. Nagyobb fertőzési nyomás esetén és az amerikai szőlőkabóca imágója ellen a magasabb dózist kell alkalmazni.	nem jelölésköteles

\*A táblázat a rovarölő permetezőszerek, 2024.06.10. napján hatályos engedélyokiratai alapján készült.

Az engedélyokiratokban történt módosításokat, a készítmény felhasználása előtt, annak engedélyokiratában szükséges ellenőrizni!

Oldal:

7/4

2024. év

Az oldalon szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek!\*



Név	Engedélyokirat száma	Engedély típusa	Kultúra	Hatóanyag	Dózis:	Permetlé l/ha	Dózis kiskerti használatra	Amerikai szőlőkabóca elleni növényvédelmi technológia	Méhveszélyesség:
<b>MONOSPEL 24 EW</b> 50 ml-esnél nagyobb kiszerezések II. forgalmi kategória, 50 ml-es és annál kisebb kiszerezések III. forgalmi kategória	6300/3269-2/2020.	származtatott engedély „A Monospel 24 EW azonos a 02.5/2322/2/2007. MgSzHK számon engedélyezett <b>Klartan 24 EW</b> rovarölő permetezőszerszel.”	szőlő	Tau-fluvalinát	0,2-0,3 l/ha  <b>Max. 2 alkalommal, két kezelés közt eltelt idő min.14 nap</b>	600-1000	3 ml szer/10 l víz	Az amerikai szőlőkabóca valamennyi fejlődési stádiuma ellen felhasználható. Elsősorban az L1-L3 fejlettségű lárvák ellen kell a védekezést időzíteni. Egy tenyészidőszak alatt maximum 2 alkalommal juttatható ki a készítmény. A további permetezéseket más hatóanyagcsoportba tartozó készítménnyel kell elvégezni. Nagyobb fertőzési nyomás esetén és az amerikai szőlőkabóca imágója ellen a magasabb dózist kell alkalmazni.	nem jelölésköteles
<b>MOSPILAN 20 SG</b> Forg.kat.: 200g - 5 kg - I. 5g -120g - II. 4 g-ig III.	04.2/2883-1/2011. MgSzH; 6700/0043200- 1/2024.	alapengedély	szőlő	Acetamiprid	0,25-0,375 kg/ha  <b>Max. 1 alkalommal használható</b>	400-800	2,5-3,75 g/10 l víz	Szőlőben az amerikai szőlőkabóca esetében előrejelzés alapján a fiatal lárvák (L1-L3) ellen kell időzíteni a védekezést. <b>A készítmény tebukonazol tartalmú növényvédő szerrel együtt tankkeverékként kijuttatva méhekre veszélyes, ebben az esetben méhkímélő technológia alkalmazása szükséges!</b>	nem jelölésköteles <b>(Tebukonazol tartalmú növényvédőszerrel keverve MÉHEKRE VESZÉLYES!)</b>
<b>MOVENTO</b> I. kategória <i>Felhasználása 2025. október 30-ig engedélyezett.</i>	04.2/7527-1/2016. NÉBIH; 6300/220-1/2022 6700/0035796- 1/2024.	alapengedély  <b>szőlő anyatelep</b>	szőlő (anyatelep)	Spirotetramat	0,7 l/ha  <b>Max. 2 alkalommal, két kezelés közt eltelt idő min.14 nap</b>	500-800	-	Szőlő anyatelepen az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) esetében a lárvák ellen kell időzíteni a védekezést.	<b>kifejezetten veszélyes</b>
<b>NEXSUBA</b> II. kategória	6700/332-2/2023 NÉBIH	származtatott engedély "A Nexsuba azonos a 02.5/1414/4/2008. MgSzHK számon engedélyezett <b>Laser</b> rovarölő permetezőszerszel."	szőlő	Spinozad	0,4 l/ha  <b>Max. 2 alkalommal, két kezelés közt eltelt idő min.7 nap</b>	600-1000	-	Amerikai szőlőkabóca ellen 0,4 l/ha dózissal a fiatal lárvák ellen szükséges kipermetezni.	mérsékelt kockázatos
<b>NINJA ZEON 5 CS</b> III. kategória	04.2/329-1/2015.	származtatott engedély „A Ninja Zeon 5 CS azonos a <b>Karate Zeon 5 CS</b> , 11769/2002. FVM számon engedélyezett rovarölő permetezőszerszel.”	szőlő	Lambda- cihalotrin	0,25 l/ha  <b>Max. 2 alkalommal, két kezelés közt eltelt idő min.10 nap</b>	800-1000	2,5 ml/ 5 l víz	Amerikai szőlőkabóca ellen 0,25 l/ha dózissal célszerű permetezni az L1-L3 fejlettségű lárvák megjelenésekor. Az okiratban a kijuttatáshoz feltüntetett vízmennyiségek javasolt értékek. A kijuttatás során a permetlé mennyiségét a kezelendő növényállomány fejlettségétől, lombfelületétől és művelésmódjától, valamint az alkalmazott géptípustól függően kell megválasztani.	mérsékelt kockázatos

\*A táblázat a rovarölő permetezőszerek, 2024.06.10. napján hatályos engedélyokiratai alapján készült.

Az engedélyokiratokban történt módosításokat, a készítmény felhasználása előtt, annak engedélyokiratában szükséges ellenőrizni!

Oldal:

7/5

2024. év

Az oldalon szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek!\*



Név	Engedélyokirat száma	Engedély típusa	Kultúra	Hatóanyag	Dózis:	Permetlé l/ha	Dózis kiskerti használatra	Amerikai szőlőkabócára előírt növényvédelmi technológia	Méhveszélyesség:
<b>RAFTING</b> Forg.kat.: 200g - 5 kg - I. 5g -120g - II. 4 g-ig III.	04.2/396-1/2017.	származtatott engedély „A Rafting azonos a 04.2/2883-1/2011. MgSzH számon engedélyezett <b>Mospilan 20 SG</b> rovarölő permetezőszerszel.”	szőlő	Acetamiprid	0,25-0,375 kg/ha  <b>Max. 1 alkalommal használható</b>	400-800	2,5-3,75 g/10 l víz	Szőlőben az amerikai szőlőkabóca esetében előrejelzés alapján a fiatal lárvák (L1-L3) ellen kell időzíteni a védekezést. <b>A készítmény tebukonazol tartalmú növényvédő szerrel együtt tankkeverékként kijuttatva méhekre veszélyes, ebben az esetben méhkímélő technológia alkalmazása szükséges!</b>	nem jelölésköteles <b>(Tebukonazol tartalmú növényvédőszerrel keverve MÉHEKRE VESZÉLYES!)</b>
<b>SIVANTO ENERGY</b> I. kategória	6300/2328-2/2022 NÉBIH; 6700/0026899-2/2024.	alapengedély	szőlő (bor, csemege)	Deltametrin, flupiradifuron	0,4 l/ha  <b>Max. 2 alkalommal, két kezelés közt eltelt idő min.14 nap</b>	100-1200	-	Az amerikai szőlőkabóca lárvái és kifejlett egyedei ellen előrejelzésre alapozva kell a védekezést végrehajtani. A lárvák egyedszámát a levelek fonákán végzett egyedszámolással, a rajzó imágók népességét ragadós sárgalappal végzett csapdázással lehet megállapítani.	kifejezetten kockázatos
<b>SIVANTO PRIME</b> 50ml, 1 liter kiszerezés II. kategória; 200 liter I. kategória	6300/368-1/2019. NÉBIH; 6700/1691-2/2023.	alapengedély	szőlő (bor, csemege)	Flupiradifuron	0,4 0,5 l/ha  <b>Max. 1 alkalommal használható</b>	400-1000	-	Amerikai szőlőkabóca ellen a második, harmadik stádiumú lárvák ellen célszerű védekezni. Mivel a kikelt lárvák a keléstől számított 30-40 napig nem képesek a fitoplazma terjesztésére ezért, az első lárvák megjelenésétől számított 30 nap után végzett kezeléssel tudjuk jó eséllyel a betegség terjedését megakadályozni. A fűrtvirágzat nyúlása idején a javasolt dózis 0,4 l/ha, a zsendülés idején azonban 0,5 l/ha alkalmazása javasolt. A permetlé mennyiségét a kezelendő lombfelület nagyságától függően kell megválasztani. <b>A készítmény tebukonazol tartalmú növényvédő szerrel együtt tankkeverékként kijuttatva méhekre veszélyes, ebben az esetben méhkímélő technológia alkalmazása szükséges!</b>	nem jelölésköteles <b>(Tebukonazol tartalmú növényvédőszerrel keverve MÉHEKRE VESZÉLYES!)</b>
<b>SPILAN 20 SG</b> Forg.kat.: 200g - 5 kg - I. 5g -120g - II. 4 g-ig III.	04.2/2679-2/2011. MgSzH. 04.2/3383-1/2013.	származtatott engedély „A Spilan 20 SG azonos a <b>Mospilan 20 SG</b> 04.2/2883-1/2011. MgSzH számon engedélyezett rovarölő permetezőszerszel.”	szőlő	Acetamiprid	0,25-0,375 kg/ha  <b>Max. 1 alkalommal használható</b>	400-800	2,5-3,75 g/10 l víz	Szőlőben az amerikai szőlőkabóca esetében előrejelzés alapján a fiatal lárvák (L1-L3) ellen kell időzíteni a védekezést. <b>A készítmény tebukonazol tartalmú növényvédő szerrel együtt tankkeverékként kijuttatva méhekre veszélyes, ebben az esetben méhkímélő technológia alkalmazása szükséges!</b>	nem jelölésköteles <b>(Tebukonazol tartalmú növényvédőszerrel keverve MÉHEKRE VESZÉLYES!)</b>

\*A táblázat a rovarölő permetezőszerek, 2024.06.10. napján hatályos engedélyokiratai alapján készült.

Az engedélyokiratokban történt módosításokat, a készítmény felhasználása előtt, annak engedélyokiratában szükséges ellenőrizni!

Oldal:

7/6

2024. év

Az oldalon szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek!\*



Név	Engedélyokirat száma	Engedély típusa	Kultúra	Hatóanyag	Dózis:	Permetlé l/ha	Dózis kiskerti használatra	Amerikai szőlőkabócára előírt növényvédelmi technológia	Méhveszélyesség:
<b>WAKIZASI</b> II. kategória A szer felhasználása 2025. október 30-ig engedélyezett.	04.2/472-2/2018. 6700/0046361-1/2024	származtatott engedély „A Wakizasi rovarölő permetezőszers azonos a 02.5/966/2/2010. MgSzHK számon engedélyezett <b>Kaiso EG</b> rovarölő permetezőszersrel.”	szőlő (csemege- borszőlő)	Lambda- cihalotrin	0,25 kg/ha  <b>Max. 1 alkalommal használható</b>	600-1200	-	Amerikai szőlőkabócaellen 0,25 kg/ha dózissal célszerűpermetezni az L1-L3 fejlettségűlárvák megjelenésekor. A permetlé mennyiségét az ültetvények művelésmódjától, lombfelületének nagyságától és a géptípustól függően kell megválasztani.	mérsékelten veszélyes

\*A táblázat a rovarölő permetezőszerek, 2024.06.10. napján hatályos engedélyokiratai alapján készült.  
Az engedélyokiratokban történt módosításokat, a készítmény felhasználása előtt, annak engedélyokiratában szükséges ellenőrizni!