

AKTUÁLIS POLLENHELYZET SZEKSZÁRDON, ÉS KÖRNYÉKÉN 2024. 36. HÉTEN

Szekszárdon 2024-ben a Tolna vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya az Országos Aerobiológiai Monitorozás keretében 2024. január 30-án, az 5. héten helyezte üzembe a pollencsapdát – hasonló időszakban, mint az előző években. A csapda üzembe helyezése óta folyamatosan működik.

ORSZÁGOS HELYZET (09. 09.):

A PARLAGFŰ POLLENKONCENTRÁCIÓJA ORSZÁGOSAN NAGYON MAGAS - A HÉT ELEJÉN ENYHÜLÉS ÉRKEZIK.

A hét első napjaiban érkező hidegfront zárja le a parlagfűszezont elhúzódó tetőzését. Hétfőn a pollenterhelés még **országszerte nagyon magas, az Alföldön sokfelé extrém magas szintet is elérhet.** A front érkezése előtt záporok, zivatarok alakulnak ki. A **zivatarokhoz kapcsolódó szél erősödés felkavarja a pollenszemeket, ami a tünetek rohamszerű fokozódásához vezethet.** Felhívjuk az allergiások figyelmét, hogy zivatar közeledtekor csukják be az ablakokat!

A Dunántúlon hétfőn délután, a Tiszántúlon kedden várható a csapadék érkezése, ami - a korábbinál sokkal enyhébb - magas szintre mérsékli a pollenkoncentrációt. A tartósan csapadékos tájakon **alacsony-közepes szintre is javulhat a pollenterhelés.** A front átvonulása után, szerdán ismét **országszerte magas, az Alföldön nagyon magas** szintre emelkedhet vissza a pollenkoncentráció, ami azonban már jelentősen elmarad a múlt héten tapasztalt csúcserőktől.

A többi lágyszárú allergén közül a libatopfélék pollenkoncentrációja országosan közepes, a **csalánféléké,** az ürömé és a kenderféléké az alacsony - közepes tartományban alakulhat. A pázsitfűfélék, az útifű, a lórom, valamint a szerbtövis, a rézgyom és az ernyősvirágzatúak virágporának mennyisége országosan alacsony.

A kültéri allergén gombák közül az *Alternaria* spóraszámja országosan a magas - nagyon magas, az *Epicoccum* az alacsony - közepes tartományban alakulhat.

A parlagfűre érzékenyeknél továbbra is erős tünetek jelentkezhetnek, melyek lehetnek orr- és szájnyálkahártya viszketés, orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés.

A parlagfűre érzékeny allergiások számára fontos a megfelelő gyógyszerek szedése, valamint szükség esetén a szakorvos felkeresése. A tünetek enyhítésére javasolt a pollen-előrejelzés folyamatos követése, valamint vegyék figyelembe honlapunkon található tanácsainkat.

Részletes polleninformációk a Nemzeti Népegészségügyi Központ oldalán érhetők el: <https://www.nnk.gov.hu/index.php/kozegezessegugyi-laboratoriumi-foosztaly/terkepes-informaciok/polleninformaciok>

(forrás: Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ)

SZEKSZÁRDON a 36. héten az összpollenszám a múlt héthez képest csökkent, a parlagfű pollenkoncentrációja országosan nagyon magas.


A parlagfű (Ambrosia****) nagyon magas, míg a libatopfélék (Chenopod.**) magas- közepes koncentrációt értek el a levegőben.

A csalánfélék (Urticaceae^{***}) közepes- alacsony, az üröm (Artemisia^{****}), továbbá a fészekvirágzatúak (Asteraceae^{***}), a kenderfélék (Cannabaceae^{*}), az útifű (Plantago^{***}), a pázsitfűfélék (Poaceae^{****}) és a szerbtövis (Xanthium^{***}) virágporai alacsony tartományban voltak.

Szintén alacsony koncentrációban, de már elvétve volt megtalálható a levegőben a tiszafafélék (Cupr.-Tax.^{**}), a fenyőfélék (Pinaceae^{*}) és a hárs (Tilia^{**}) pollenjei.


A kültéri allergén gombák közül az Alternaria magas- nagyon magas, míg a Cladosporium spóraszám nagyon közepes- alacsony tartományban ingadozott a 36. héten, Szekszárdon.

Az alábbi diagram mutatja a fák-bokrok virágzásának megkezdődése óta a pollenszám alakulását Szekszárdon:



A levegőben lévő pollenek nagy hányadát most már a parlagfű virágpóra teszi ki a kenderfélék, libatopfélék és a csalánfélék mellett, mindemellett 08. 18-ra el is érte a nagyon magas koncentráció szintet. A parlagfű virágzását, és a pollen koncentráció emelkedését elősegíti a parlagfű virágzásának kedvező időjárás, a meleg, de csapadékos idő. Az előrejelzések szerint a következő hetekben a nyári meleg idő marad, és csapadék is várható. Így a nem kaszált parlagfüves területeken nagyon gyorsan virágba borulhatnak a kifejlett növények.

A korábbi évek adatai alapján várhatóan augusztus végén, szeptember elején éri el a parlagfű virágzása a maximumot. Ez a folyamatosan végzett irtással megelőzhető még most is. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a meleg, csapadékos időben várható a pollenszórásának erősödése. A július végi, augusztus eleji adatok alapján a sokévi átlaggal azonos volt a parlagfű pollenjének a mennyisége a levegőben, de augusztus második felében már meghaladta az elmúlt évek tendenciáját. Ezt mutatja a mellékelt ábra:



Figyelmeztetés: Mostantól várhatóan október végéig a parlagfű pollenje folyamatosan jelen lesz a levegőben. Koncentrációja – az időjárás függvényében – heteken keresztül a magas-nagyon magas koncentráció tartományban lehet.

A parlagfű irtásakor is különös gonddal kell eljárni, még a nem allergiások számára is a légzésvédő, és a védőkesztyű használata az allergiás reakciók kialakulásának megelőzése érdekében erősen javasolt!

Hasznos tanácsok pollenallergiásoknak:

Magas parlagfű pollenkoncentráció esetén és megfelelő gyógykezelés hiányában, az allergiásoknak számítani kell a tünetek megjelenésére, úgymint tüsszögés, vizes orrfolyás, orrviszketés, orrdugulás (és emiatt esetleges alvászavarok), garatviszketés, fülviszketés, könnyezés, szemviszketés, "piros szem" (kötőhártya-gyulladás), szem-fáradékonyság, továbbá fáradtság - és levertség - érzés, nagyobb alvási igény. Nagyon magas parlagfű pollenkoncentrációnál már minden érintettnek erős, vagy igen erős tünetei lehetnek. A parlagfű pollenkoncentráció emelkedésével egyre fokozódik az asztmás tünetegyüttes jelentkezésének valószínűsége is.

- Magas parlagfű pollenszám esetén minél kevesebb időt töltsenek a szabadban.
- Mossanak haját - ami az egyik fő pollenraktár - naponta lefekvés előtt, hiszen a pollenszemcsék ezrei tapadhatnak meg rajta.
- Minél gyakrabban és alaposabban porszívózzák a lakást, amilyen gyakran csak lehet nedves lemosást is alkalmazzanak.
- A cipőket naponta tisztítsák nedves ruhával, törölgék át.
- Naponta cseréljék és mossák ruháikat, mert a pollen könnyen rátapad.
- Gyakran cseréljék az ágyneműt is, elsősorban a párnahuzatot.
- Kerüljék a ruhák szabadban történő szárítását magas pollenkoncentráció esetén.
- Magas pollenszórás idején ne nyissák ki a gépkocsik ablakát menet közben

Az egyéni védelem fejlesztése érdekében célszerű figyelemmel kísérni a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásait.

Faültetés előtt, a megfelelő növény kiválasztásához érdemes a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján tájékozódni, főként, ha légúti allergiás van a családban. Közterületek zöldítése esetén is ajánlatos kevésbé allergizáló fajokat választani. Ehhez megfelelő információkat a következő oldalon lehet találni: <https://efop180.antsz.hu/temak-konyezetegeszsegugy/allergenek-a-levegoben/allergenek-hogyan-valasszunk-kertunkbe-fakat-cserjeket.html>

<https://efop180.antsz.hu/attachments/article/491/Allerg%C3%A9n%20n%C3%B6v%C3%A9nyek%201.pdf> (forrás: Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ)

Vezesse tüneteit a pollennaplóban, kövesse azok változását a pollenkoncentráció hatására! Regisztráljon ingyenesen a www.pollendiary.com oldalon és naplózza tüneteit legalább három héten át!

POLLENALLERGIÁSOKNAK: POLLENNAPLÓ

Az Országos Környezetegészségügyi Intézet és a Bécsi Egyetem közötti együttműködés keretében elkészült a **pollennapló** magyar nyelvű változata.

A www.pollendiary.com/Phd/hu címen elérhető weblapon egy gyors regisztrációt követően az allergiások személyre szabott, hasznos információhoz juthatnak tüneteik és a pollenkoncentráció összefüggéséről. Ennek segítségével követhetik, hogy a lehetséges tünetek hogyan függenek össze azzal a légköri pollenkoncentrációval, amit adott időszakban a tartózkodási hely közelében mértek.

A pollennapló kiadását jelentős szakmai érdeklődés előzte meg hazánkban, és a betegek részéről már régóta jelentkező igényt teljesített meg. A pollennapló jelentős lépést jelent az új generációs beteg tájékoztatásban, mivel az információ személyre szabott.

Az oldal hasznos mind a betegek, mind az orvosok, illetve családtagok számára. A felhasználó információhoz juthat a tüneteik és a pollenkoncentráció összefüggéséről. Ennek segítségével a felhasználó követheti, hogy a tünetek hogyan függenek össze az elmúlt napokban a tartózkodási helyének közelében mért légköri pollenkoncentrációval. Az adatbázis egész Európára érvényes, az irányítószám megadásával a felhasználó mindig az aktuális tartózkodási helyét rendelheti a tüneteikhez, a megjelenő grafikonok görbéi arra a régióra vonatkozó pollen átlagértékeket mutatják a korábbi napokra vonatkozóan.

A tüneteket az érintett testrészekre vonatkozóan (szem, orr, stb.) ill. a tünetek súlyossága szerint, több fokozatban lehet megadni. Azt is számításba veszi a rendszer, hogy a felhasználó szed-e valamilyen gyógyszert a tüneteik enyhítésére. A rendszert évtizedek óta hagyományos formában gyűjtött betegnapló adatok és statisztikai modellek alapozták meg. A pollennapló tartalma az OKI szakértőinek legjobb tudása szerint lett összeállítva, figyelembe véve az aerobiológia legújabb tudományos eredményeit és elméleteit. Mindezen tartalmak, az interaktív modulok és szolgáltatások célja nem az orvosi tanácsadás helyettesítése, és nem alkalmasak egyéni diagnózis felállítására vagy tanácsadásra, vagy bármiféle kezelés megalapozására.

A pollennapló vezetéséhez díjmentesen lehet regisztrálni, a szolgáltatott pollen adatok ingyenesek. A készítőik abban a reményben hozták létre ezt a szolgáltatást, hogy a pollenadatok személyre szabott formában még hasznosabb információt szolgáltatassanak az egészségük védelme érdekében.

FIGYELEM!!

A Pollen Napló tartalma nem helyettesíti a szakorvosi tanácsadást, kezelést