



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal, mint növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró szerv (továbbiakban élelmiszerlánc-felügyeleti szerv) a **szőlő arany színű sárgaság fitoplazma (*Grapevine flavescence dorée phytoplasma*, továbbiakban: FD zárlati károsító) zárlati károsítót terjesztő amerikai szőlőkabóca ellen az alábbi 2025. évre vonatkozó első védekezési felhívást teszi közzé Dabronc település közigazgatási területe vonatkozásában:**

VÉDEKEZÉSI FELHÍVÁS I.

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya 2023. évben a Túrje 4489 hrsz. alatti szőlő ültetvényben a szőlő arany színű sárgaság fitoplazma (FD zárlati károsító) okozta fertőzést állapított meg. Erre tekintettel a Zala Vármegyei Kormányhivatal a 2024.01.08. napján kelt ZAF/010/00065-1/2024 számú határozatában Túrje települést fertőzött területté (továbbiakban: fertőzött terület), illetve a fertőzött terület határától mért 3 km sugarú részt puffer zónának jelölte ki Zala vármegye vonatkozásában.

Mivel a fertőzött terület pufferzónája a Veszprém vármegyei Dabronc települést is érinti, ezért az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a VE/31/00470-3/2024 számú határozatában Dabronc község közigazgatási területét pufferzónának jelölte ki és növény-egészségügyi zárlati intézkedésként előírta, hogy a szőlő vegetációja során az FD zárlati károsító rovarvektorai ellen 3 alkalommal növényvédő szeres védekezést kell elvégezni az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által a védekezésre, védekezés optimális idejére vonatkozó hirdetményi úton közzétett védekezési felhívások figyelembe vételével.

Az FD zárlati károsító által okozott **szőlő arany színű sárgaság betegség** a szőlő egyik veszélyes betegsége, amitől a fertőzött szőlőtőkék néhány év alatt leromlanak, termés hozamuk csökken, végül a növények kipusztulnak. A károsítóval fertőzött növényeket gyógyítani nem lehet, a **védekezés csak a megelőzésre szűkül**, ezért különösen fontos a szőlőültetvényekben a járványos elterjedésében szerepet játszó **amerikai szőlőkabóca (*Scaphoideus titanus*)**, mint vektor elleni védekezés a hirdetményi úton közzétett védekezési felhívások figyelembevételével.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv vizsgálatai szerint a Dabronc településen az **amerikai szőlőkabóca tömeges lárvakelése 2025. évben május utolsó, június első napjaiban volt tapasztalható, június második hetében már második lárvastádiumú egyedek is fellelhetőek**. Erre, illetve a szőlőnövények fejlettségére tekintettel a lárvák elleni **első kezelést a szőlő virágzása alatt, vagy a virágzás után, de legkésőbb június 25. napjáig, a második kezelést, ez első kezelés után 2-3 hét múlva, legkorábban júliusban, de legkésőbb július 15. napjáig kell elvégezni**.

A kifejlett egyedek elleni harmadik kezelésre újabb védekezési felhívás kerül kiadásra a kabóca csapdák fogási eredményei alapján.

A védekezésre a felhívás mellékletének táblázatban szereplő rovarölő szerek alkalmazhatók.

Megjegyzendő, hogy az amerikai szőlőkabóca fiatal lárvái a szőlőnövények törzsein található hajtásokon nagy egyedszámban megtalálhatók, ezért az eredményes védekezés feltétele, hogy a kötelező kezelések előtt a szőlőnövényeken a törzstisztítás elvégzésre kerüljön, vagy amennyiben nem történik meg, a kezelések a tőhajtásokat is érik. Továbbá a védekezés hatékonyságát növeli, ha a lárvák elleni védekezés során legalább egyszer felszívódó növényvédő szer kerül felhasználásra. A hatásos védekezéshez hozzájárulhat a megfelelő permetlé borítottság. A felszívódó szereknél a lombfal alsó leveleire mindenképpen kerüljön permetcsepp, mivel a felszívódott hatóanyag szállítása a hajtásvégek felé történik. Ez azért fontos, mert a lárvák a fás növényi részek környezetében lévő leveleken gyakrabban fordulnak elő. A kontakt növényvédő szerek esetében a teljes lombfalon a levelek mindkét oldalának a fedettsége szükséges, mivel a lárvák általában a levél fonáki részen tartózkodnak. A növényvédő szerek kijuttatása során - adott esetben - figyelmet kell fordítani a gyártó ajánlása szerint a permetlé pH-jának beállítására, valamint a növényvédő szerek UV érzékenysége miatt a kijuttatás napszakának a megválasztására.

Lényeges, hogy nem elég a növényvédő szereket kijuttatni, hanem azok hatékonyságáról is célszerű meggyőződni.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv felhívja a szőlőtermelők figyelmét, hogy a védekezés során az integrált növényvédelem alapelveinek érvényre jutása érdekében a növényvédelmi technológia meghatározása során figyelemmel kell lenni a rezisztencia kialakulásának megelőzésére, ezért a növényvédő szerek okirataiban meghatározott kezelések évenkénti maximális számának betartása mindenkor szükséges. Ezentúl figyelmet kell fordítani a növényvédő szer használat sorrendjére is, hogy a későbbi kötelező harmadik kezelés során olyan növényvédő szert tudjanak még kijuttatni, amely az akkori szőlő fenostádiumban még engedélyezett, és az élelmezés-egészségügyi várakozási idő is betartható legyen, valamint védelmet nyújtson az amerikai szőlőkabóca kifejlett alakja ellen is.

Veszprém, 2025.06.12.

Takács Szabolcs főispán
névén és megbízásából:
Odor Tamás
osztályvezető



1. számú melléklet a 2024. évi védekezési felhíváshoz

	Kabócák ellen engedélyezett szerek szőlőben	Hatóanyag	Forgalmazási kategória	A kezelés évenkénti maximális száma	Két kezelés között eltelt minimális időtartam	Az utolsó kezelés fenosztádiuma	Méhvészélyesség
Kontakt	Decis ¹	deltametrin	III.	2	14 nap	zsendülés (BBCH 85)	mérsékelten kockázatos
	Decis Mega (PL) ^{1,5}	deltametrin	II.	3	14 nap	zsendülés (BBCH 85)	mérsékelten kockázatos
	Decis Forte ^{1,5}	deltametrin	I.	2	14 nap	szedés érettség (BBCH 87)	mérsékelten kockázatos
	Detector ^{1,5}	deltametrin	I.	2	14 nap	szedés érettség (BBCH 87)	mérsékelten kockázatos
	Kaiso Garden ^{2,5}	lambda-cihalotrin	III.	1	-	fürtzáródás (BBCH 78)	mérsékelten kockázatos
	K1 ^{3,5}	lambda-cihalotrin	III.	1	-	fürtzáródás (BBCH 78)	mérsékelten kockázatos
	Kaiso EG ^{3,5}	lambda-cihalotrin	II.	1	-	fürtzáródás (BBCH 78)	mérsékelten veszélyes
	Kaiso Sorbie ^{3,5}	lambda-cihalotrin	II.	1	-	fürtzáródás (BBCH 78)	mérsékelten veszélyes
	Wakizasi ^{3,5}	lambda-cihalotrin	II.	1	-	fürtzáródás (BBCH 78)	mérsékelten veszélyes
	Hunter ^{3,5}	lambda-cihalotrin	II.	1	-	fürtzáródás (BBCH 78)	mérsékelten veszélyes
	Jager EG ^{3,5}	lambda-cihalotrin	II.	1	-	fürtzáródás (BBCH 78)	mérsékelten veszélyes
	Karate Zeon 5 CS (BG, PL, RO) ^{2,5}	lambda-cihalotrin	III.	2	10 nap	fürtzáródás (BBCH 78)	mérsékelten kockázatos
	Karate Zeon 050 CS ^{2,5}	lambda-cihalotrin	III.	2	10 nap	fürtzáródás (BBCH 78)	mérsékelten kockázatos
	Ninja Zeon 5 CS ^{2,5}	lambda-cihalotrin	III.	2	10 nap	fürtzáródás (BBCH 78)	mérsékelten kockázatos
	Kendo 5 CS ^{2,5}	lambda-cihalotrin	III.	2	10 nap	fürtzáródás (BBCH 78)	mérsékelten kockázatos
	Full 5 CS ^{2,5}	lambda-cihalotrin	III.	2	10 nap	fürtzáródás (BBCH 78)	mérsékelten kockázatos
	Lamdex Extra ^{2,5}	lambda-cihalotrin	III.	2	10 nap	fürtzáródás (BBCH 78)	mérsékelten veszélyes
	Klartan 24 EW	tau-fluvalinát	I. ; II.	2	14 nap	érés kezdete, bogyószíneződés (BBCH 80)	nem jelölésköteles
	Mavrik 24 EW	tau-fluvalinát	I. ; II.	2	14 nap	érés kezdete, bogyószíneződés (BBCH 80)	nem jelölésköteles
	Monospel 24 EW	tau-fluvalinát	I. ; II.	2	14 nap	érés kezdete, bogyószíneződés (BBCH 80)	nem jelölésköteles
Felszívódó	Laser ^{3,5}	spinozad	II.	2	7 nap	két héttel a betakarítás előtt (BBCH 84)	mérsékelten kockázatos
	Nexsuba ^{3,5}	spinozad	II.	2	7 nap	két héttel a betakarítás előtt (BBCH 84)	mérsékelten kockázatos
	Laser Duplo ^{3,5}	spinozad	II. ; III.	2	7 nap	két héttel a betakarítás előtt (BBCH 84)	mérsékelten kockázatos
	Limocide ³	narancsolaj	II.	6	7 nap	2. levél kiterülésétől (BBCH 12) fogyasztásra érettségig (BBCH 89)	kifejezetten kockázatos
	Sivanto Prime ^{2,4}	flupiradifuron	II.	1	-	zsendülés (BBCH 81)	nem jelölésköteles
	Sanium System ²	flupiradifuron	II. ; III.	1	-	érés kezdete (BBCH 82)	nem jelölésköteles
	Deltam System ²	flupiradifuron	II. ; III.	1	-	érés kezdete (BBCH 82)	nem jelölésköteles
	Sivanto Energy ^{1,2,5}	deltametrin + flupiradifuron	I.	2	14 nap	érés kezdete (BBCH 81)	kifejezetten veszélyes
	Exirel ¹	ciántraniliprol	I.	2	14 nap	zsendülés (BBCH 85)	kifejezetten veszélyes
	Mospilan 20 SG (DE, RO) ⁴	acetamiprid	I.-III.	1	-	érés (BBCH 89)	nem jelölésköteles
	Rafting ⁴	acetamiprid	I.-III.	1	-	érés (BBCH 89)	nem jelölésköteles
	Spilan 20 SG ⁴	acetamiprid	I.-III.	1	-	érés (BBCH 89)	nem jelölésköteles
	Gazelle 20 SG ⁴	acetamiprid	I.-III.	1	-	érés (BBCH 89)	nem jelölésköteles

Megjegyzés:

- 1 agrár-környezetvédelmi programban tiltott, de jelen védekezési felhívás alapján felhasználható
- 2 agrár-környezetvédelmi programban kizárólag a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 1. § 10. pontja szerinti szakirányító írásbeli javaslatára használható vagy a „Növényvédelmi szakirányító bevonása a gazdálkodásba” vállalás választásakor
- 3 ökológiai gazdálkodásban is engedélyezett a felhasználása
- 4 tebukonazol tartalmú növényvédő szerrel együtt tankkeverékként alkalmazva, virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki.
- 5 Virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki.